

RODZAJE ZABIEGÓW, NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH W CHIRURGII PRZODOSTOPIA:

Korekcja met. Chevron- podgłówna osteotomia I kości śródstopia, najczęściej wymaga zastosowania implantu, polega na odpowiednim nacięciu kości śródstopia i przesunięciu fragmentów względem siebie, implant stabilizuje właściwe ustawienie

Korekcja met. Scarf- osteotomia I kości śródstopia, kształt cięcia przypomina literę „Z”, fragmenty są również przesuwane i stabilizowane implantem

Met. Akina- dotyczy paliczka bliższego palucha i to na tym poziomie odbywa się korekcja jego koślawego ustawienia, często stosowana jako procedura uzupełniająca np. korekcję met. Chevron lub Scarf

Korekcja met. McBride/ Silver- zabieg polega na usunięciu zwyrodnieniowo zmienionych tkanek w okolicy stawu śródstopno- paliczkowego palucha i uwolnieniu tzw miękkich tkanek, utrzymujących koślawe ustawienie

Met. Lapidus- korekcja koślawego ustawienia i nadmiernej mobilności poprzez usztywnienie stawu klinowo- śródstopnego (tzw „artrodezę”), wymaga implantu

Met. Kellera- polega głównie na usunięciu podstawy paliczka bliższego palucha i ponownym „uruchomieniu” zmienionego chorobą zwyrodnieniową stawu śródstopno- paliczkowego palucha

Cheilektomia- plastyka okolicy stawu śródstopno- paliczkowego palucha poprzez dokładne usunięcie wszystkich wyrosła, powstałych na tle choroby zwyrodnieniowej i ograniczających ruchomość stawu